

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

NIVO+FOLFOXIRI (G-FOLFOXIRI) (インフューザ[®]-使用)
(登録No. 25G101)

病名	推奨度
胃癌	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／
Nivolumab (240mg)		↓
CPT-11 (150mg/m ²)		↓
1-LV (200mg/m ²)		↓
1-OHP (85mg/m ²)		↓
5-FU (2400mg/m ²)		↓
	Day 1	
(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)		

オキサリプラチンの投与回数は最大8回まで

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ 全開	(1)
2 生理食塩液 100 mL オプジーボ点滴静注	(240) mg	点滴注射 30分 0.2または0.22μmの インラインフィルターを使用	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトロン点滴静注 ^{ハック} 0.75mg/50 アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液 6.6 mg デキサート注射液 1.65 mg	50 mL 1 瓶 1 瓶 2 A	点滴注射 30分	(1)
5 大塚生食注 (250mL袋) リナカ [®] 塩酸塩点滴静注液	() mg (150mg/m ²)	点滴注射 90分	(1)
6 大塚生食注 (250mL袋) レボホリナート点滴静注用	() mg (200mg/m ²)	点滴注射 120分 オキサリプラチンと同時滴下 側管	(1)

7 ブドウ糖液5% (250 mL) オキサリプラチン点滴静注液	() m g (85m g / m ²)	250 mL	点滴注射 120分 ほかリナトと同時滴下	(1)
8 生理食塩液 50 mL		50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
9 フルオロウラシル注 生理食塩液 50 mL	() m g (2400m g / m ²)	50 mL	中心静脈注射・精密持続 インフューザー使用 46時間 生食希釈量早見表参照	(1)
10 デカドロン錠4mg		8 m g	内服 day2-4 朝昼食後	