

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者 I D

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医 師	印
S c r	mg/dL		
C c r	ml/min		

NIVO+FOLFOXIRI (G-FOLFOXIRI) (入院用)

(登録No. 25GI02)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 コース目・変更)

病 名	推奨度
胃癌	C

		予定日付	
Nivolumab	(240mg)	↓	↓
CPT-11	(150mg/m ²)	↓	↓
1-LV	(200mg/m ²)	↓	↓
1-OHP	(85mg/m ²)	↓	↓
5-FU	(1200mg/m ²)	↓	↓
		Day 1	2
		(1サイクル 14 日) (休薬 12 日以上)	

オキサリプラチンの投与回数は最大8回まで

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ 全開 フルオラシル急速投与後のフラッシュまで パルビン針セット 二股タイプ 使用	(1)
2 生理食塩液 100 mL オブジーボ点滴静注	100 mL (240) mg	点滴注射 30分 0.2または0.22μmの インラインフィルターを使用	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6 mg デキサート注射液 1.65 mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分	(1)
5 大塚生食注 (250mL袋) リナテカ塩酸塩点滴静注液	250 mL () mg (150mg/m ²)	点滴注射 90分	(1)
6 大塚生食注 (250mL袋) レボホリナート点滴静注用	250 mL () mg (200mg/m ²)	点滴注射 120分 オキサリプラチンと同時滴下 側管	

7	ブドウ糖液5% (250 mL) オキサリプラチン点滴静注液 (	250 mL) mg (85mg/m ²)	点滴注射 120分 レボリナートと同時滴下	(1)
8	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
9	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フルオウラシルルートプライミング用	(1)
10	生理食塩液テルモ 500 mL フルオウラシル注 (	500 mL) mg (1200mg/m ²)	点滴注射 23時間	(1) (2)
11	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フルオウラシルフラッシュ用	(2)
12	アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1 点滴開始前	
13	アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2, 3 朝食後	
14	デカドロン錠4mg	8 mg	内服 day2-4 朝昼食後	