

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名
患者 I D
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
S c r	mg/dL	医 師	印
C c r	ml/min		

ZOL (初回) + FOLFOXIRI (G-FOLFOXIRI) (インフュー
(登録No. 25G103)

病 名	推奨度
胃癌	C

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 コース目・変更)

	予定日付	／
Zolbetuximab	(800m g / m ²)	↓
C P T - 1 1	(150m g / m ²)	↓
l - L V	(200m g / m ²)	↓
l - O H P	(85m g / m ²)	↓
5 - F U	(2400m g / m ²)	↓
	Day	1
	(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)	

オキサリプラチンの投与回数は最大8回まで

1	パロセトロン点滴静注 ^{ハック} 0.75mg/50	50 m L	点滴注射	
	アロカリス点滴静注235mg	1 瓶	30分	
	デキサート注射液 6 . 6 m g	1 瓶		
	デキサート注射液 1 . 6 5 m g	2 A		(1)
2	生理食塩液 - F C 1 0 0 0 m L	1000 m L	点滴注射	
	ビロイ点滴静注用100mg () m g (800m g / m ²)		インラインフィルター使用	
	注射用水 P L 1 0 0 m L	100 m L	希釈後、6時間以内に投与完了	
			希釈後の濃度2.0mg/mL	
			注射用水5m L / Vで溶解	
			投与速度表参照	(1)
3	生理食塩液 5 0 m L	50 m L	点滴注射	
			フラッシュ用	(1)
4	大塚生食注 (250mL袋)	250 m L	点滴注射	
	リノテカン塩酸塩点滴静注液 () m g (150m g / m ²)		90分	(1)
5	大塚生食注 (250mL袋)	250 m L	点滴注射	
	レボホリナート点滴静注用 () m g (200m g / m ²)		120分	
			オキサリプラチンと同時滴下	
			側管	(1)
6	ブドウ糖液 5 % (2 5 0 m L)	250 m L	点滴注射	
	オキサリプラチン点滴静注液 () m g (85m g / m ²)		120分	

			レボリナートと同時滴下	(1)
7 生理食塩液	50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
8 フルオロウラシル注 生理食塩液	50 mL	() mg (2400mg/m ²) 50 mL	中心静脈注射・精密持続 インフューザー使用 46時間 生食希釈量早見表参照	(1)
9 デカドロン錠4mg		8 mg	内服 day2,3 朝昼食後	
10 オランザピンOD錠5mg「トローワ」		1	内服 day0-4 夕食後 DM禁忌	