

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名
患者 I D
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
S c r	mg/dL	医 師	印
C c r	ml/min		

ZOL (2回目以降) + FOLFOXIRI (G-FOLFOXIRI) (1
(登録No. 25GI04)

病 名	推奨度
胃癌	C

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 コース目・変更)

	予定日付	／
Zolbetuximab	(400m g / m ²)	↓
C P T - 1 1	(150m g / m ²)	↓
l - L V	(200m g / m ²)	↓
l - O H P	(85m g / m ²)	↓
5 - F U	(2400m g / m ²)	↓
	Day	1
	(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)	

オキサリプラチンの投与回数は最大8回まで

1	パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50 アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液 6. 6 m g デキサート注射液 1. 6 5 m g	50 m L 1 瓶 1 瓶 2 A	点滴注射 30分	(1)
2	生理食塩液テルモ 5 0 0 m L ビロイ点滴静注用100mg () m g (400m g / m ²) 注射用水 P L 1 0 0 m L	500 m L () m g (400m g / m ²) 100 m L	点滴注射 インラインフィルター使用 希釈後、6時間以内に投与完了 希釈後の濃度2. 0mg/mL 注射用水5m L / Vで溶解 投与速度表参照	(1)
3	生理食塩液 5 0 m L	50 m L	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4	大塚生食注 (250mL袋) リノテカン塩酸塩点滴静注液 () m g (150m g / m ²)	250 m L () m g (150m g / m ²)	点滴注射 90分	(1)
5	大塚生食注 (250mL袋) レボホリナート点滴静注用 () m g (200m g / m ²)	250 m L () m g (200m g / m ²)	点滴注射 120分 オキサリプラチンと同時滴下 側管	(1)
6	ブドウ糖液 5 % (2 5 0 m L) オキサリプラチン点滴静注液 () m g (85m g / m ²)	250 m L () m g (85m g / m ²)	点滴注射 120分	

			レボ ホリナトと同時滴下	(1)
7 生理食塩液 50 m L	50 m L		点滴注射 フラッシュ用	(1)
8 フルオロウラシル注 生理食塩液 50 m L	() m g (2400m g / m l) 50 m L		中心静脈注射・精密持続 インフューザー使用 4 6 時間 生食希釈量早見表参照	(1)
9 デカドロン錠4mg	8 m g		内服 day2, 3 朝昼食後	
10 オランザピンOD錠 5 mg 「トーワ」	1		内服 day0-4 夕食後 DM禁忌	