

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名
患者 I D
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
S c r	mg/dL	医 師	印
C c r	ml/min		

ZOL (初回) + FOLFOXIRI (G-FOLFOXIRI) (入院用)
(登録No. 25GI05)

病 名	推奨度
胃癌	C

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 コース目・変更)

		予定日付	
Zolbetuximab	(800mg / m ²)	↓	↓
C P T - 1 1	(150mg / m ²)	↓	
l - L V	(200mg / m ²)	↓	
l - O H P	(85mg / m ²)	↓	
5 - F U	(1200mg / m ²)	↓	↓
		Day 1	2
(1サイクル 14 日) (休薬 12 日以上)			

オキサリプラチンの投与回数は最大8回まで

1	パロセトロン点滴静注パッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射	
	デキサート注射液 6. 6 mg	1 瓶	15分	
	デキサート注射液 1. 6 5 mg	2 A	5FU急速静注後のフラッシュまで	
			パルビン針セット 二股タイプ 使用	(1)
2	生理食塩液 - F C 1 0 0 0 mL	1000 mL	点滴注射	
	ビロイ点滴静注用100mg () mg (800mg / m ²)		インラインフィルター使用	
	注射用水 P L 1 0 0 mL	100 mL	希釈後、6時間以内に投与完了	
			希釈後の濃度2. 0mg/mL	
			注射用水5mL/Vで溶解	
			投与速度表参照	(1)
3	生理食塩液 5 0 mL	50 mL	点滴注射	
			フラッシュ用	(1)
4	大塚生食注 (250mL袋)	250 mL	点滴注射	
	リボホリナート塩酸塩点滴静注液 () mg (150mg / m ²)		90分	(1)
5	大塚生食注 (250mL袋)	250 mL	点滴注射	
	レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg / m ²)		120分	
			オキサリプラチンと同時滴下	
			側管	(1)
6	ブドウ糖液 5 % (2 5 0 mL)	250 mL	点滴注射	
	オキサリプラチン点滴静注液 () mg (85mg / m ²)		120分	

			レボチナートと同時滴下	(1)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用		(1)
8 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フルオウラシルルートプライミング用		(1)
9 生理食塩液テルモ 500 mL フルオウラシル注 () mg (1200mg/mL)	500 mL	点滴注射 23時間		(1) (2)
10 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フルオウラシルフラッシュ用		(2)
11 アプレピタントカプセル125mg「N	1 c p	内服 day1 点滴開始前		
12 アプレピタントカプセル80mg「NK	1 c p	内服 day2, 3 朝食後		
13 デカドロン錠4mg	8 mg	内服 day2, 3 朝昼食後		
14 オランザピンOD錠 5 mg「トーワ」	1	内服 day0-4 夕食後 DM禁忌		