

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名
患者 I D
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
S c r	mg/dL	医 師	印
C c r	ml/min		

ZOL (2回目以降) + FOLFOXIRI (G-FOLFOXIRI) (登録No. 25GI06)

病 名	推奨度
胃癌	C

施用開始日
 年
 月
 日
 (初回・継続
 コース目・変更)

	予定日付	/	/
Zolbetuximab	(400m g / m ²)	↓	
C P T - 1 1	(150m g / m ²)	↓	
l - L V	(200m g / m ²)	↓	
l - O H P	(85m g / m ²)	↓	
5 - F U	(1200m g / m ²)	↓	↓
	Day	1	2
		(1サイクル 14 日) (休薬 12 日以上)	

オキサリプラチンの投与回数は最大8回まで

1	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6. 6 m g デキサート注射液 1. 6 5 m g	50 m L 1 瓶 2 A	点滴注射 15分 5FU急速静注後のフラッシュまで パールびん針セット 二股タイプ 使用	(1)
2	生理食塩液テルモ 5 0 0 m L ビロイ点滴静注用100mg () m g (400m g / m ²) 注射用水 P L 1 0 0 m L	500 m L () m g 100 m L	点滴注射 インラインフィルター使用 希釈後、6時間以内に投与完了 希釈後の濃度2. 0mg/mL 注射用水5mL/Vで溶解 投与速度表参照	(1)
3	生理食塩液 5 0 m L	50 m L	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4	大塚生食注 (250mL袋) リノテカン塩酸塩点滴静注液 () m g (150m g / m ²)	250 m L () m g	点滴注射 90分	(1)
5	大塚生食注 (250mL袋) レボホリナート点滴静注用 () m g (200m g / m ²)	250 m L () m g	点滴注射 120分 オキサリプラチンと同時滴下 側管	(1)
6	ブドウ糖液 5 % (2 5 0 m L) オキサリプラチン点滴静注液 () m g (85m g / m ²)	250 m L () m g	点滴注射 120分	

			レボピナートと同時滴下	(1)
7	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
8	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フルオウラシルルートプライミング用	(1)
9	生理食塩液テルモ 500 mL フルオウラシル注 () mg (1200mg/mL)	500 mL	点滴注射 23時間	(1) (2)
10	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フルオウラシルフラッシュ用	(2)
11	アプレピタントカプセル125mg「N	1 c p	内服 day1 点滴開始前	
12	アプレピタントカプセル80mg「NK	1 c p	内服 day2,3 朝食後	
13	デカドロン錠4mg	8 mg	内服 day2,3 朝昼食後	
14	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	1	内服 day0-4 夕食後 DM禁忌	