

化学療法スケジュール表

- ☐ 一般治療
- ☐ 臨床試験
- ☐ 治験

患者氏名

患者 I D

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
S c r	mg/dL	医 師	印
C c r	ml/min		

(6週)パムリズマブ+Her (初回)+Cap0X
(登録No. 25GI09)

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 コース目・変更)

病 名

胃癌

推奨度
B

		予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Pembrolizumab	(400m g)		↓									
1－OHP	(130m g /m ²)		↓									
Trastuzumab	(8m g /kg)		↓									
C a p e	(2000m g /m ²)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	Day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1－OHP	(130m g /m ²)						↓					
Trastuzumab	(6m g /kg)						↓					
C a p e	(2000m g /m ²)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day,		11	12	13	14	22	23	24	25	26	27
	予定日付		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C a p e	(2000m g /m ²)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
	Day		28	29	30	31	32	33	34	35		
(1サイクル 42 日) (休薬 7 日以上)												

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ	(1)
2 生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注 (400) mg	100 mL	点滴注射 30分 0.2-5μmのインラインフィルター使用 希釈後の濃度1-10mg/mLになるよう調製	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50 デキサート注射液6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1) (22)
5 ブドウ糖液5% (250 mL) オキサリプラチン点滴静注液 () mg (130mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分	(1) (22)
6 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (22)

7 大塚生食注 (250mL袋)	250 m L	点滴注射	
トラスツズマブBS点滴静注用 () m g (8m g /kg)		90分	
注射用水 20 m l	20 m L	60mg : 注射用水3.0mLで溶解	
		150mg : 注射用水7.2mLで溶解	(1)
8 大塚生食注 (250mL袋)	250 m L	点滴注射	
トラスツズマブBS点滴静注用 () m g (6m g /kg)		30分	
注射用水 20 m l	20 m L	60mg : 注射用水3.0mLで溶解	
		150mg : 注射用水7.2mLで溶解	
		初回投与忍容性良好なら	
		30分に短縮可能	(22)
9 生理食塩液 50 m L	50 m L	点滴注射	
		フラッシュ用	(1) (22)
10 カペシタビン錠300mg「ヤクルト () m g (2000m g /m ²)		内服	
		朝夕食後	
		カペシタビンの投与量は以下の通り	
		1. 36m ² 未満 : 1200mg/回	
		1. 36m ² 以上1. 66m ² 未満 : 1500mg/回	
		1. 66m ² 以上1. 96m ² 未満 : 1800mg/回	
		1. 96m ² 以上 : 2100mg/回	