

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**(3週)パブロリスマブ+Her (2回目以降)+SOX**  
(登録No. 25GI12)

病名	推奨度
胃癌	B

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pembrolizumab (200mg)	↓										
1-OHP (130mg/m <sup>2</sup> )	↓										
Trastuzumab (6mg/kg)	↓										
S-1 (80mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/						
S-1 (80mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓							
	Day	11	12	13	14						

(1サイクル 21日) (休薬 7日以上)

1 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ	(1)
2 生理食塩液 100mL キイトルーダ点滴静注	100 mL ( 200) mg	点滴注射 30分 0.2-5μmのインラインフィルター使用 希釈後の濃度1-10mg/mLになるよう調製	(1)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
5 ブドウ糖液 5% (250mL) オキサリプラチン点滴静注液	250 mL ( ) mg (130mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 120分	(1)
6 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
7 大塚生食注 (250mL袋) トラスツズマブBS点滴静注用 注射用水 20mL	250 mL ( ) mg (6mg/kg) 20 mL	点滴注射 30分 60mg : 注射用水3.0mLで溶解 150mg : 注射用水7.2mLで溶解 初回投与忍容性良好なら	

8 生理食塩液 50 mL	50 mL	30分に短縮可能	(1)
		点滴注射 フラッシュ用	(1)
9 エスワнтаイホウ配合OD錠	( ) mg (80mg/m <sup>2</sup> )	内服 朝夕食後 S-1の投与量は以下の通り 体表面積1.25m <sup>2</sup> 未満→80mg/day 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満→100mg/day 1.5m <sup>2</sup> 以上→120mg/day	