

化学療法スケジュール表

- ☐ 一般治療
- ☐ 臨床試験
- ☐ 治験

患者氏名

患者 I D

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
S c r	mg/dL	医 師	印
C c r	ml/min		

(6週)パブロリスマブ+Her+(初回)+SOX
(登録No. 25GI13)

病 名	推奨度
胃癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 コース目・変更)

		予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Pembrolizumab	(400m g)		↓									
1 - OHP	(130m g / m ²)		↓									
Trastuzumab	(8m g / kg)		↓									
S - 1	(80m g / m ²)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1 - OHP	(130m g / m ²)						↓					
Trastuzumab	(6m g / kg)						↓					
S - 1	(80m g / m ²)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day,	11	12	13	14	22	23	24	25	26	27
		予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
S - 1	(80m g / m ²)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
		Day	28	29	30	31	32	33	34	35		
(1サイクル 42 日) (休薬 7 日以上)												

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ	(1)
2 生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注 (400) mg	100 mL	点滴注射 30分 0.2-5μmのインラインフィルター使用 希釈後の濃度1-10mg/mLになるよう調製	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50 デキサート注射液6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1) (22)
5 ブドウ糖液5% (250 mL) オキサリプラチン点滴静注液 () mg (130mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分	(1) (22)
6 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (22)

7 大塚生食注 (250mL袋)	250 m L	点滴注射	
トラスツズマブBS点滴静注用 () m g (8m g /kg)		90分	
注射用水 20 m l	20 m L	60mg : 注射用水3.0mLで溶解	
		150mg : 注射用水7.2mLで溶解	(1)
8 大塚生食注 (250mL袋)	250 m L	点滴注射	
トラスツズマブBS点滴静注用 () m g (6m g /kg)		30分	
注射用水 20 m l	20 m L	60mg : 注射用水3.0mLで溶解	
		150mg : 注射用水7.2mLで溶解	
		初回投与忍容性良好なら	
		30分に短縮可能	(22)
9 生理食塩液 50 m L	50 m L	点滴注射	
		フラッシュ用	(1) (22)
10 エスワнтаイハウ配合OD錠 () m g (80m g /m ²)		内服	
		朝夕食後	
		S-1の投与量は以下の通り	
		体表面積1.25m ² 未満→80mg/day	
		1.25m ² ~1.5m ² 未満→100mg/day	
		1.5m ² 以上→120mg/day	