

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

(6週) へムロズマブ + Her (3回目以降) + SOX
(登録No. 25GI14)

病名	推奨度
胃癌	B

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Pembrolizumab (400mg)	↓										
1-OHP (130mg/m ²)	↓										
Trastuzumab (6mg/kg)	↓										
S-1 (2000mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1-OHP (130mg/m ²)						↓					
Trastuzumab (6mg/kg)						↓					
S-1 (2000mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	11	12	13	14	22	23	24	25	26	27
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
S-1 (2000mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	28	29	30	31	32	33	34	35		

(1サイクル 42日) (休薬 7日以上)

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ	(1)
2 生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注	100 mL (400) mg	点滴注射 30分 0.2-5μmのインラインフィルター使用 希釈後の濃度1-10mg/mLになるよう調製	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6 mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)(22)
5 ブドウ糖液 5% (250 mL) オキサリプラチン点滴静注液	250 mL () mg (130mg/m ²)	点滴注射 120分	(1)(22)
6 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)(22)

<p>7 大塚生食注 (250mL袋) トラスツズマブBS点滴静注用 () mg (6mg/kg) 注射用水 20ml</p>	<p>250 mL () mg 20 mL</p>	<p>点滴注射 30分 60mg : 注射用水3.0mLで溶解 150mg : 注射用水7.2mLで溶解 初回投与忍容性良好なら 30分に短縮可能</p>	(1) (22)
<p>8 生理食塩液 50mL</p>	<p>50 mL</p>	<p>点滴注射 フラッシュ用</p>	
<p>9 エスワнтаイホウ配合OD錠 () mg (2000mg/m²)</p>	<p>() mg (2000mg/m²)</p>	<p>内服 朝夕食後 S-1の投与量は以下の通り 体表面積1.25m²未満→80mg/day 1.25m²~1.5m²未満→100mg/day 1.5m²以上→120mg/day</p>	