

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

チスレリズマブ+FP (80-800)

(登録No. 25GI16)

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病名	推奨度
食道癌	B

	予定日付	/	/	/	/	/
5-FU (800mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Tislelizumab (200mg)	↓					
CDDP (80mg/m ²)	↓					
Day	1	2	3	4	5	
	(1サイクル 21日)		(休薬 16日以上)			

day2以降十分な輸液必要 総コース数：6コース 以降はチスレリズマブ単剤

1 生理食塩液 100mL	100 mL	点滴注射 90分 メイン フルオウラシルルートプライミング [®] 用	(1)
2 生理食塩液テルモ 500mL フルオウラシル注 () mg (800mg/m ²)	500 mL	点滴注射 メイン 24時間	(1) (2) (3) (4) (5)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 メイン フルオウラシルフラッシュ [®] 用	(5)
4 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ 全開 側管	(1)
5 生理食塩液 100mL テビムブラ点滴静注100mg (200) mg	80 mL	点滴注射 60分 側管 初回投与の忍容性良好なら 2回目以降30分で投与可 Total 100mL 2~5mg/mLとなるように調製 0.2又は0.22µmのインラインフィルターを使用	(1)
6 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射	

			フラッシュ用 側管	(1)
7	生理食塩液テルモ 500 mL ホスアレブタント点滴静注用150mg「NK」 1 瓶	500 mL 1 瓶	点滴注射 90分 側管	(1)
8	パロセトロン点滴静注バッグ [®] 0.75mg/50 デキサート注射液6.6 mg デキサート注射液1.65 mg 2 A	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分 側管	(1)
9	生理食塩液テルモ 500 mL 硫酸Mg 補正液1mEq/mL 20 mL	500 mL 8 mL	点滴注射 90分 側管	(1)
10	マンニトールS注射液 (300mL)	300 mL	点滴注射 60分 側管	(1)
11	生理食塩液テルモ 500 mL シスプラチン点滴静注 () mg (80mg/m ²)	500 mL	点滴注射 120分 側管 CDDPの輸液量はtotal 500mlと なるように生食を抜いて調製	(1)
12	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分 側管	(1)
13	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分 側管	(1)
14	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分 側管	(1)
15	生理食塩液 100 mL デキサート注射液6.6 mg 1 瓶	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(2)
16	生理食塩液 100 mL デキサート注射液6.6 mg 2 瓶	100 mL 2 瓶	点滴注射 15分	(3)
17	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5)
18	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5)
19	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	

20 生理食塩液テルモ 500 mL

500 mL

点滴注射
120分

(2) (3) (4) (5)

(2) (3) (4) (5)