

## 化学療法スケジュール表

- 
- 一般治療
- 
- 
- 臨床試験
- 
- 
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

## 婦人科TC + Durva

(登録No. 25GY02)

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

病名	推奨度
子宮体癌	B

	予定日付	↓
Durvalmab (1120mg)		↓
PTX (175mg/m <sup>2</sup> )		↓
CBDCA (5×(G+25))		↓
	Day 1	
(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)		

総コース数：最大6コース 以降はDurva維持療法へ

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用 全開で	(1)
2 生理食塩液 100 mL イミフィンジ点滴静注	100 mL ( 1120) mg	点滴注射 60分 希釈後の最終濃度は1~15mg/mLとなるように 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを使用	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 生理食塩液 100 mL デキサート注射液6. 6 mg デキサート注射液1. 65 mg ファモチジン注射液20mg 「トワ」 ポララミン注5 mg	100 mL 2 瓶 2 A 1 A 1 A	点滴注射 15分	(1)
5 パロセトロン点滴静注ハック® 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 30分	(1)
6 ブドウ糖液5% (500 mL) パクリタキセル注	500 mL ( ) mg (175mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 180分 0.22 μm以下のインラインフィルターを使用	(1)
7 ブドウ糖液5% (250 mL) カルボプラチン点滴静注液	250 mL ( ) mg (5×(G+25))	点滴注射 60分	

25GY02 &lt;次ページ有&gt;

受付日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

8 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
9 アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1 点滴開始時	(1)
10 アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2.3 朝食後	
11 デカドロン錠0.5mg	4 mg	内服 day2.3 朝昼食後	