

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

ビキセオス (地固め療法)
(登録No. 25HT03)

病名	推奨度
急性骨髄性白血病	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

予定日付 / / (65単位/m ²) ↓ ↓ Day 1 3 (1サイクル 35 日) (休薬 32 日以上)

高リスクAML 総コース数：最大2コース

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	中心静脈注射・精密持続 【地固め療法】 最後の寛解導入療法開始から5~8週間後 2サイクル目は1サイクル目開始から5~8週間後 ルートキープ用	(1)(3)
2 パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	中心静脈注射・精密持続 全開	(1)(3)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	中心静脈注射・精密持続 フラッシュ用	(1)(3)
4 生理食塩液テルモ 500mL ビキセオス配合静注用 () 単位 (65単位/m ²) 注射用水 20mL	500 mL 19 mL	中心静脈注射・精密持続 90分 インラインフィルターを使用しない！ 希釈後、直ちに投与を開始 直ちに投与を開始しない場合は2-8℃で 保存し、希釈後4時間以内に投与を開始	(1)(3)
5 生理食塩液 50mL	50 mL	中心静脈注射・精密持続 ビキセオスフラッシュ用 ビキセオス投与時と同じ投与速度でフラッシュ	(1)(3)