

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

エルナタマブ[®] (エルフィオ) (1-2週目)
 (登録No. 25HT04)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病名	推奨度
多発性骨髄腫	C

	予定日付	/	/	/
elranatamab (12mg)	↓			
elranatamab (32mg)		↓		
elranatamab (76mg)			↓	
Day	1	4	8	
	(1サイクル 14日)		(休薬 6日以上)	

★要時発注 サイトカイン症候群注意要 トリス[®] マ[®] 準備要

1 エルレフィオ皮下注44mg	(12) mg	皮下注射 調製後、4時間以内に使用	(1)
2 エルレフィオ皮下注44mg	(32) mg	皮下注射 調製後、4時間以内に使用	(4)
3 エルレフィオ皮下注76mg	(76) mg	皮下注射 調製後、4時間以内に使用	(8)
4 デカドロン錠4mg ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「 アセトアミノフェン錠500mg「マ	20 mg 1 錠 2 錠	内服 エルフィオ投与60分前に内服	

25HT04

受付日 年 月 日