

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ビーリンサイト 9 μ g継続用(BW 45kg以上)
(登録No. 25HT07)

病名	推奨度
急性リンパ性白血病	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

Blinatumomab	(9 μ g)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		Day	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Blinatumomab	(9 μ g)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Day	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Blinatumomab	(9 μ g)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Day	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	21	22	23	24	25	26	27	28		

(1サイクル 42 日) (休薬 14 日以上)

再発又は難治性B細胞性急性リンパ性白血病

1 大塚生食注 (250mL袋)	250 mL	中心静脈注射・精密持続 持続 注入時間24時間 メイン 10mL/hr
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)		
2 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 mg	100 mL 3 瓶	中心静脈注射・精密持続 30分 側管
		(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	中心静脈注射・精密持続 全開 側管 ビーリンサイト投与前 ルートプライミング [®] 用
		(1) (8) (15) (22)
4 大塚生食注 (250mL袋) 生理食塩液 20 mL ビーリンサイト点滴静注用35 μ g () 注射用水 20 mL	250 mL 20 mL 9 μ g 3 mL	中心静脈注射・精密持続 持続 注入時間24時間 側管 10mL/hr 投与速度厳守!! 24時間経過のタイミングで必ず交換! 全量投与はせず残液は廃棄!! フラッシュ禁止!!
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)		

