

## 化学療法スケジュール表

☐ 一般治療  
☐ 臨床試験  
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

|      |                |     |   |
|------|----------------|-----|---|
| 身長   | cm             | 診療科 |   |
| 体重   | kg             |     |   |
| 体表面積 | m <sup>2</sup> |     |   |
| Scr  | mg/dL          | 医師  | 印 |
| Ccr  | ml/min         |     |   |

**High dose MTX**  
 (登録No. 25HT11)

| 病名     | 推奨度 |
|--------|-----|
| 悪性リンパ腫 | A   |

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

|     |                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|--------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTX | (5000mg/m <sup>2</sup> ) | 予定日付 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|     |                          | ↓    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |                          | Day  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

(1サイクル 14 日) (休薬 6 日以上)

**MTX : 3~8g/m<sup>2</sup> ※脳神経外科は別レジメン (24NE01) を使用**

|   |                                                                |               |                                                                               |                          |
|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | ソルデム3A輸液 500mL                                                 | 500 mL        | 点滴注射<br>10:00~翌10:00                                                          | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) |
| 2 | グラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL                                          | 1 袋           | 点滴注射<br>朝 全開                                                                  | (1)                      |
| 3 | 生理食塩液 100mL<br>ダイアモックス注射用 500mg                                | 100 mL<br>1 瓶 | 点滴注射<br>朝 全開                                                                  | (1)(2)(3)                |
| 4 | ブドウ糖液5% (500mL)<br>メソトレキセート注射用 ( ) mg (5000mg/m <sup>2</sup> ) | 500 mL        | 点滴注射<br>180分<br>MTX:3~8g/m <sup>2</sup><br>11:00~14:00<br>total 500mLとなるように調製 | (1)                      |
| 5 | 生理食塩液 50mL                                                     | 50 mL         | 点滴注射<br>フラッシュ用                                                                | (1)                      |
| 6 | グラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL                                          | 1 袋           | 点滴注射<br>夕 全開                                                                  | (1)                      |
| 7 | 生理食塩液 100mL<br>ダイアモックス注射用 500mg                                | 100 mL<br>1 瓶 | 点滴注射<br>夕 全開                                                                  | (1)(2)(3)                |
| 8 | ソルデム3A輸液 500mL<br>メイロン静注8.4% 20mL                              | 500 mL<br>1 A | 点滴注射<br>180分<br>補液追加あり                                                        | (1)(2)(3)                |
| 9 | 生理食塩液 50mL                                                     | 50 mL         | 点滴注射                                                                          |                          |

25HT11 &lt;次ページ有&gt;

受付日 年 月 日

ロイコボリン注 3 m g

15 m g

全開

MTX終了24hr後(day2 14:00)より  
6時間毎(2° 8° 14° 20° )に投与  
MTXの血中濃度が0.1  $\mu$  M以下に  
なるまで投与継続する

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)