

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

Pola-R-CHP (外来用・2コース目以降)

(登録No. 25HT26)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病名	推奨度
悪性リンパ腫	B

		予定日付	/	/	/	/	/	/
Rit-BS	(375mg/m ²)	↓						
Pola	(1.8mg/kg)		↓					
DXR	(50mg/m ²)		↓					
CPA	(750mg/m ²)		↓					
		Day	1	2	3	4	5	6
		(1サイクル 21日) (休薬 15日以上)						

総コース数：6コース

1 生理食塩液 50mL ポララミン注 5mg	50 mL 1 A	点滴注射 全開	(1) (2)
2 生理食塩液テルモ 500mL リツキシマブBS点滴静注 () mg (375mg/m ²)	500 mL () mg (375mg/m ²)	点滴注射 180分 2コース目からは始め1時間 100ml/hr 以降200ml/hr	(1)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 生理食塩液 100mL ポライビー点滴静注用 () mg (1.8mg/kg) 注射用水 20mL	100 mL () mg (1.8mg/kg) 20 mL	点滴注射 30分 30mg製剤は注射用水1.8mLで溶解 140mg製剤は注射用水7.2mLで溶解 20mg/mLの濃度として必要量を調製 0.2又は0.22μmの インラインフィルターを通して投与 忍容性良好であれば、2回目以降の 投与時間は30分まで短縮可	(2)
5 生理食塩液 100mL	100 mL	点滴注射 30分	(2)
6 グラセトリオン点滴静注バッグ 1mg/50mL	1 袋	点滴注射 全開	

7	生理食塩液 100 mL ドキシリン塩酸塩注射用50mg「NK」 (	100 mL) mg (50mg / ml)	点滴注射 30分	(2)
8	生理食塩液テルモ 500 mL エンドキサン注射用 (	500 mL) mg (750mg / ml)	点滴注射 120分	(2)
9	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(2)
10	アセトアミノフェン錠200mg 「マ	2 錠	内服 リキシマブ 投与30分前	
11	アセトアミノフェン錠200mg 「マ	2 錠	内服 ポラビニール 投与30分前	
12	プレドニン錠 5 mg	100 mg	内服 1日2回朝食後 day2-6 朝12錠、昼8錠	