

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面积	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

アミバンタマブ + CBDCA/Pem (C3-4 BW < 80kg)
(登録No. 25LU06)

病名	推奨度

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

薬剤	用量	予定日付	
Pem	(500mg/m ²)	↓	
CBDCA	(5×(G+25))	↓	
Amivantamab	(1750mg)	↓	
Day	1	(1サイクル 21日) (休薬 20日以上)	

Exson20挿入変異陽性 総コース数：最大4コース

1	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 1.65mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
2	生理食塩液 100 mL ペムレセト点滴静注液「NK」 () mg (500mg/m ²)	100 mL	点滴注射 10分	(1)
3	ブドウ糖液 5% (250 mL) カルボプラチン点滴静注液 () mg (5×(G+25))	250 mL	点滴注射 60分	(1)
4	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
5	アセリオ静注液1000mgバッグ ポララミン注 5 mg ファモチジン注射液20mg「トワ」	1 袋 1 A 1 A	点滴注射 15分	(1)
6	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
7	大塚生食注 (250mL袋) ライブリバント点滴静注350mg (1750) mg	250 mL	点滴注射 120分 輸液ポンプを用いて投与 投与速度は125mL/hで投与 0.2または0.22μmのインラインフィルターを使用 Total 250mLとなるように調製 調製後、10時間以内に投与完了	(1)

8 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 ライブリバント投与時と同じ速度でフラッシュ	(1)
9 アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1 点滴開始時	
10 アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2, 3 朝食後	
パンビタン末	1g	内服 分1 朝食後 7日前より連日内服	
メチコバル注射液 500 μg	2A	筋肉内注射 7日前より9週毎投与	
<p>*Pem による皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン 8mg/日 予防投与を行う</p>			