

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

アミバンタマブ + CBDCA/Pem (C5以降 BW < 80kg)
(登録No. 25LU08)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

Pem	(500mg/m ²)	予定日付	↓
Amivantamab	(1750mg)		↓
		Day	1
(1サイクル 21日) (休薬 20日以上)			

Exson20挿入変異陽性

1	生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
2	生理食塩液 100 mL ペムトレキセト点滴静注液「NK」	() mg (500mg/m ²)	100 mL 点滴注射 10分	(1)
3	アセリオ静注液1000mgバッグ ポララミン注 5 mg ファモチジン注射液20mg「トワ」	1 袋 1 A 1 A	点滴注射 15分	(1)
4	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
5	大塚生食注 (250mL袋) ライブリバント点滴静注350mg	250 mL (1750) mg	点滴注射 120分 輸液ポンプを用いて投与 投与速度は125mL/hで投与 0.2または0.22μmのインラインフィルターを使用 Total 250mLとなるように調製 調製後、10時間以内に投与完了	(1)
6	生理食塩液 50 mL バンビタン末 1g メチコパール注射液 500 μg	50 mL 内服 分1 朝食後 7日前より連日内服 2A 筋肉内注射 7日前より9週毎投与	点滴注射 フラッシュ用 ライブリバント投与時と同じ速度でフラッシュ	(1)

*Pem による皮疹が出現した場合、次コースより投与前日から投与翌日までデカドロン 8mg/日 予防投与を行う