□ 治験

## 化学療法スケジュール表

□一般治療 □ 臨床試験

推奨度

患者氏名

患者ID

生年月日

白, 巨			
身 長	cm	<b>→</b> 人 \ <b>ナニイ</b> リ	
体 重	kg	診療科	
体表面積	m²		
Scr	mg/dL	医 師	即
Ссr	m1/min		E.

Biweekly Cmab+P (登録No. 2				病名 推奨   頭頚部癌 B
施用開始日    年	<u> </u>	月	日	
(初回・継続 コ	ース目・	• 変更)		
子	定日付	/	/ /	
C mab (500 m g / m²)		<b>\</b>	<b>\</b>	
$PTX \qquad (100 \text{m g/m}^2)$	D	↓ 1	↓ ↓ 8 15	
	Day <sub>L</sub>	<u>1</u> (1サイク)		(休薬 13 日以上)
1 生理食塩液 100mL		100 m	L	
デキサート注射液 6.6 mg		1 瓶		15分
デキサート注射液1.65mg	:	1 A		
ポララミン注5mg		1 A		
ファモチジ゛ン注射液20mg「トーワ」	*	1 A		(1) (8) (1
   2 生理食塩液 100mL		100 m	L	点滴注射
				30分
AND MARK CONTROL CONTROL STATE OF STATE				点滴注射
アービタックス注射液100m	ıg(	) m	$g (500 \text{mg/m}^2)$	
				total $250 \mathrm{m}\mathrm{L}$
4 华丽泰特茨 50 1		50	т	
4 生理食塩液 50mL		50 m	L	点滴注射
****				フラッシュ用 Cmab投与時と同じ速度で
				CiliatyXy チャイと [4] C 座及 (1) (1
   5 ブドウ糖液5%(250mL)		250 m	I.	点滴注射
パクリタキセル注				
,	(2)			(1) (8) (1
6 生理食塩液 50mL		50 m	L	点滴注射
				フラッシュ用
				(1) (8) (1
.50 ×				