

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名
 患者ID
 生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
S c r	mg/dL	医師	印
C c r	ml/min		

tw Her (初回) + Per (初回) + Weekly PTX
 (登録No. 26BR01)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病名	推奨度
乳癌	B

	予定日付	/	/	/
PTX (80mg/m ²)		↓	↓	↓
Pertuzumab (840mg)		↓		
Trastuzumab (8mg/kg)		↓		
	Day	1	8	15
(1サイクル 21 日) (休薬 6 日以上)				

1 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
デキサート注射液 6.6 mg	1 瓶	15分	
デキサート注射液 1.65 mg	1 A		
ファモチジン注射液20mg「ト-ワ」	1 A		
ポララミン注 5 mg	1 A		(1) (8) (15)
2 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
		30分	(1) (8) (15)
3 ブドウ糖液 5% (250 mL)	250 mL	点滴注射	
パクリタキセル注 () mg (80mg/m ²)		60分	(1) (8) (15)
4 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
			(1)
5 大塚生食注 (250mL袋)	250 mL	点滴注射	
パージェタ点滴静注420mg/14mL () mg	840) mg	60分	(1)
6 大塚生食注 (250mL袋)	250 mL	点滴注射	
トラスツズマブBS点滴静注用 () mg (8mg/kg)		90分	
注射用水 20 mL	20 mL	2回目以降、4週間以上投与間隔が空いている場合は、初回の投与量(8mg/kg)で、60分での投与可 60mg:注射用水3.0mLで溶解 150mg:注射用水7.2mLで溶解	(1)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (8) (15)

