

## 化学療法スケジュール表

- 
- 一般治療
- 
- 
- 臨床試験
- 
- 
- 治験

患者氏名  
 患者 I D  
 生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**フェスゴ(2回目以降)+Weekly PTX**  
 (登録No. 26BR04)

病名	推奨度
乳癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

PTX	(80mg/m <sup>2</sup> )	予定日付	/	/	/
フェスゴ <sup>®</sup> MA	(1瓶)		↓	↓	↓
		Day	1	8	15
(1サイクル 21 日) (休薬 6 日以上)					

1	生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
	デキサート注射液 6.6 mg	1 瓶	15分	
	デキサート注射液 1.65 mg	1 A		
	ファモチジン注射液20mg 「トワ」	1 A		
	ポララミン注 5 mg	1 A		(1) (8) (15)
2	生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
			30分	
				(1) (8) (15)
3	ブドウ糖液 5% (250 mL)	250 mL	点滴注射	
	パクリタキセル注 ( ) mg (80mg/m <sup>2</sup> )		60分	
				(1) (8) (15)
4	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
			フラッシュ用	
				(1) (8) (15)
5	フェスゴ配合皮下注 MA ( 1) 瓶		皮下注射	
			5分	
			大腿部に皮下注	
			5分以上かけて投与	
			投与後15分経過観察	
			※2回目以降は、infusion reaction 等の問題がなく、忍容性が良好であれば観察時間は15分まで短縮可	
				(1)