

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

| | | | |
|-------|----------------|-----|---|
| 身長 | cm | 診療科 | |
| 体重 | kg | | |
| 体表面積 | m ² | 医師 | 印 |
| S c r | mg/dL | | |
| C c r | ml/min | | |

フェスゴ（初回）＋アブラキサン

(登録No. 26BR07)

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

| 病名 | 推奨度 |
|----|-----|
| 乳癌 | B |

| | 予定日付 | ／ |
|--------------------------------------|------|---|
| Na b - P T X (260mg/m ²) | | ↓ |
| フェスゴ IN (1瓶) | | ↓ |
| | Day | 1 |
| (1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上) | | |

特定生物由来製品のため同意書、使用記録保存必要

| | | | |
|--|--------|--------|-----|
| 1 生理食塩液 100 mL | 100 mL | 点滴注射 | |
| デキサート注射液 6.6 mg | 1 瓶 | 15分 | (1) |
| 2 生理食塩液 100 mL | 100 mL | 点滴注射 | |
| アブラキサン点滴静注用 100 () mg (260mg/m ²) | | 30分 | (1) |
| 1Vあたり生食20mLで溶解し必要量を空にした生食容器に注入する フィルター不可 | | | |
| 3 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 | |
| | | フラッシュ用 | (1) |
| 4 フェスゴ配合皮下注 IN () 1) 瓶 | | 皮下注射 | |
| | | 8分 | (1) |
| 大腿部に皮下注 8分以上かけて投与 投与後30分経過観察 | | | |