

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

| | | | |
|-------|----------------|-----|---|
| 身長 | cm | 診療科 | |
| 体重 | kg | | |
| 体表面積 | m ² | 医師 | 印 |
| S c r | mg/dL | | |
| C c r | ml/min | | |

フェスゴ（初回）＋エリブリン

(登録No. 26BR09)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

| 病名 | 推奨度 |
|----|-----|
| 乳癌 | B |

| | 予定日付 | / | / |
|----------------------------------|------|---|---|
| エリブリン (1.4mg/m ²) | | ↓ | ↓ |
| フェスゴ IN (1瓶) | | ↓ | |
| | Day | 1 | 8 |
| (1サイクル 21 日) (休薬 13 日以上) | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 mg | 100 mL 1 瓶 | 点滴注射 15分 | (1) (8) |
| 2 生理食塩液 50 mL エリブリンシリン酸塩静注液 1mg 「ニプロ」 () mg (1.4mg/m ²) | 50 mL | 点滴注射 5分 0.01mg/mL未満の濃度に 希釈しないこと！ 調製後、6時間以内に使用すること 冷所で保存する場合、24時間以内に使用 | (1) (8) |
| 3 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 | (1) (8) |
| 4 フェスゴ配合皮下注 IN () 1) 瓶 | | 皮下注射 8分 大腿部に皮下注 8分以上かけて投与 投与後30分経過観察 | (1) |