

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名

患者 I D

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
S c r	mg/dL		
C c r	ml/min		

フェスゴ (2回目以降) + エリブリン

(登録No. 26BR10)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病名	推奨度
乳癌	B

	予定日付	/	/
エリブリン (1.4 mg/m ²)		↓	↓
フェスゴ MA (1瓶)		↓	
	Day	1	8
(1サイクル 21 日) (休薬 13 日以上)			

1 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1) (8)
2 生理食塩液 50 mL エリブリンメシル酸塩静注液 1mg 「エブリン」 () mg (1.4 mg/m ²)	50 mL	点滴注射 5分 0.01mg/mL未満の濃度に 希釈しないこと！ 調製後、6時間以内に使用すること 冷所で保存する場合、24時間以内に使用	(1) (8)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (8)
4 フェスゴ配合皮下注 MA () 1) 瓶		皮下注射 5分 大腿部に皮下注 5分以上かけて投与 投与後15分経過観察 ※2回目以降は、infusion reaction 等の問題がなく、忍容性が良好で あれば観察時間は15分まで短縮可	(1)