化学療法スケジュール表

□ 一般治療
□ 臨床試験
□ 治験

患者氏名
患者ＩＤ
生年月日

身　長	cm	診療科	
体　重	kg		
体表面積	m^2	医　師	印
Ｓｃｒ	mg/dL		
Ｃｃｒ	ml/min		

ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ［6週］＋PTX(80)＋ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS
（登録No. 26GY01）

病　名	推奨度
卵巣癌	B

施用開始日　　年　　月　　日

（初回・継続＿＿＿＿コース目・変更）

		予定日付	／	／	／	／	／	／
Pembrolizumab	(400mg)		↓					
ＰＴＸ	(80mg/m²)		↓	↓	↓	↓	↓	↓
Bmab	(15mg/kg)		↓			↓		
		Day	1	8	15	22	29	36

（1ｻｲｸﾙ 42 日）（休薬 6 日以上）

1 生理食塩液　５０ｍＬ		50 ｍＬ	点滴注射 ルートキープ用 (1)
2 生理食塩液　１００ｍＬ キイトルーダ点滴静注	(　400) ｍｇ	100 ｍＬ	点滴注射 30分 0.2-5μｍのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用 (1)
3 生理食塩液　５０ｍＬ		50 ｍＬ	点滴注射 フラッシュ用 (1)
4 生理食塩液　１００ｍＬ デキサート注射液６．６ｍｇ デキサート注射液１．６５ｍｇ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射液20mg「ﾄｰﾜ」 ポララミン注５ｍｇ	1 瓶 1 Ａ 1 Ａ 1 Ａ	100 ｍＬ	点滴注射 15分 (1) (8) (15) (22) (29) (36)
5 生理食塩液　１００ｍＬ		100 ｍＬ	点滴注射 30分 (1) (8) (15) (22) (29) (36)
6 ブドウ糖液５％（２５０mL） パクリタキセル注	(　　) ｍｇ (80mg/m²)	250 ｍＬ	点滴注射 60分 0.22μ以下のﾒﾝﾌﾞﾗﾝﾌｨﾙﾀｰを用いた ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 (1) (8) (15) (22) (29) (36)
7 生理食塩液　５０ｍＬ		50 ｍＬ	点滴注射 フラッシュ用 (1) (8) (15) (22) (29) (36)
8 生理食塩液　１００ｍＬ ベバシズマブBS点滴静注用	(　　) ｍｇ (15mg/kg)	100 ｍＬ	点滴注射 90分

			初回投与忍容性良好なら ２回目投与は60分可 ２回目投与忍容性良好なら 以降の投与は30分可 (1)(22)
9 生理食塩液　５０ｍＬ		50 ｍＬ	点滴注射 フラッシュ用 (1)