化学療法スケジュール表

□ 一般治療
□ 臨床試験
□ 治験

患者氏名
患者ＩＤ
生年月日

身　長	cm	診療科	
体　重	kg		
体表面積	m^2	医　師	印
Ｓｃｒ	mg/dL		
Ｃｃｒ	ml/min		

Ｂｅｌａ－Ｐｄ（Bela 1段階減量）
（登録No. 26HT11）

施用開始日　　年　　月　　日

（初回・継続＿＿＿＿コース目・変更）

病　名	推奨度
多発性骨髄腫	B

		予定日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
Belantamab	(1.9mg/kg)		↓								
Pomalidomide	(4mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ＤＥＸ	(40mg)		↓							↓		
		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		予定日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
Pomalidomide	(4mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ＤＥＸ	(40mg)						↓					
		Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		予定日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
Pomalidomide	(4mg)		↓		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ＤＥＸ	(40mg)			↓	↓							↓
		Day	21	22	29	30	31	32	33	34	35	36
		予定日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
Pomalidomide	(4mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ＤＥＸ	(40mg)								↓			
		Day	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
		予定日付	／	／	／	／						
Pomalidomide	(4mg)		↓	↓	↓							
ＤＥＸ	(40mg)					↓						
		Day	47	48	49	50						

（1ｻｲｸﾙ 56 日）（休薬 6 日以上）

76歳以上や全身状態不良例はDEX1回20mgへ減量 ★要時発注：ﾌﾞｰﾚﾝﾚｯﾌﾟ、ﾎﾞﾏﾘｽﾄ(1mg、3mg)

1 生理食塩液　５０ｍＬ		50 ｍＬ	点滴注射 ルートキープ用
			(1)
2 大塚生食注（250mL袋）		250 ｍＬ	点滴注射
ブーレンレップ	（　　）	ｍｇ (1.9mg/kg)	30分
注射用水　２０ｍｌ		20 ｍＬ	濃度0.2～2ｍｇ/ｍＬに調製 2段階減量は1.4mg/kgとし、 生食100mLへ変更すること
			(1)
3 生理食塩液　５０ｍＬ		50 ｍＬ	点滴注射 フラッシュ用

受付日　　年　　月　　日

4 ポマリストカプセル4mg	(4) ｍｇ	内服 day1-21 day29-49
5 レナデックス錠４ｍｇ	(40) ｍｇ	内服 day1, 8, 15, 22 day29, 36, 43, 50