化学療法スケジュール表

□ 一般治療
□ 臨床試験
□ 治験

患者氏名

患者ＩＤ

生年月日

身　長	cm	診療科	
体　重	kg		
体表面積	m^2	医　師	印
Ｓｃｒ	mg/dL		
Ｃｃｒ	ml/min		

Ｔａｆａ－Ｒ２（1コース目）

（登録No. 26HT17）

施用開始日　　年　　月　　日

（初回・継続 ＿＿＿＿ コース目・変更）

病　名	推奨度
濾胞性リンパ腫	B

		予定日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ＰＳＬ	(100mg)		↓							↓		
Tafasitamab	(12mg/kg)		↓							↓		
Rit-ＢＳ	(375mg/m²)		↓							↓		
ＬＥＮ	(20mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		予定日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ＰＳＬ	(100mg)						↓					
Tafasitamab	(12mg/kg)						↓					
Rit-ＢＳ	(375mg/m²)						↓					
ＬＥＮ	(20mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		予定日付	／	／								
ＰＳＬ	(100mg)			↓								
Tafasitamab	(12mg/kg)			↓								
Rit-ＢＳ	(375mg/m²)			↓								
ＬＥＮ	(20mg)		↓									
		Day	21	22								

（1ｻｲｸﾙ 28 日）（休薬 6 日以上）

総ｺｰｽ数：12ｺｰｽ　ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞは5ｺｰｽまで、ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞは12ｺｰｽまで　★要時発注：ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ

1 生理食塩液　５０ｍＬ	50 ｍＬ	点滴注射
ポララミン注５ｍｇ	1 Ａ	全開
		(1)(8)(15)(22)
2 生理食塩液　５０ｍＬ	50 ｍＬ	点滴注射
プレドニン（水溶性）２０ｍｇ （	100）ｍｇ	30分
		(1)(8)(15)(22)
3 生理食塩液　１００ｍＬ	100 ｍＬ	点滴注射
		30分
		(1)(8)(15)(22)
4 生理食塩液　１００ｍＬ	100 ｍＬ	点滴注射
ミンジュビ点滴静注用200mg （	）ｍｇ (12mg/kg)	90分
注射用水　２０ｍｌ	20 ｍＬ	初回投与開始～30分：70mL/hr
		その後速度を上げる
		投与速度125mL/hrを超えないこと

受付日　　年　　月　　日

			※２回目以降は１時間で投与 40mg/mLに溶解し希釈、 最終濃度2～8mg/mLに調製 83kg以上は生食250mLに希釈 (1) (8) (15) (22)
5 生理食塩液　５０ｍＬ		50 ｍＬ	点滴注射 15分 (1) (8) (15) (22)
6 大塚生食注（500mL袋） リツキシマブBS点滴静注	(	500 ｍＬ) ｍｇ (375mg/m²)	点滴注射 180分 初回　～60分　25ml/hr 60～120分　100ml/hr 120分以降　200ml/hr 2コース目からは始め1時間 100ml/hr　以降200ml/hr ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ投与終了15分以降に開始 (1) (8) (15) (22)
7 生理食塩液　５０ｍＬ		50 ｍＬ	点滴注射 フラッシュ用 (1) (8) (15) (22)
8 アセトアミノフェン錠500mg「マ		2 錠	内服 ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ投与60分前 day1, 8, 15, 22
9 ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ5mg「BMSH」	(	20) ｍｇ	内服 day1-21