化学療法スケジュール表

□ 一般治療
□ 臨床試験
□ 治験

患者氏名

患者ＩＤ

生年月日

身　長	cm	診療科	
体　重	kg		
体表面積	m^2	医　師	印
Ｓｃｒ	mg/dL		
Ｃｃｒ	ml/min		

Ｔａｆａ－Ｒ２（6-12コース）

（登録No. 26HT20）

施用開始日　　年　　月　　日

（初回・継続＿＿＿＿＿コース目・変更）

病　名	推奨度
濾胞性リンパ腫	B

		予定日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ＰＳＬ	(100ｍｇ)		↓									
Tafasitamab	(12ｍｇ/kg)		↓									
ＬＥＮ	(20ｍｇ)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		予定日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ＰＳＬ	(100ｍｇ)						↓					
Tafasitamab	(12ｍｇ/kg)						↓					
ＬＥＮ	(20ｍｇ)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		予定日付	／									
ＬＥＮ	(20ｍｇ)		↓									
		Day	21									

（1ｻｲｸﾙ 28 日）（休薬 7 日以上）

総ｺｰｽ数：12ｺｰｽ　ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞは5ｺｰｽまで、ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞは12ｺｰｽまで　★要時発注：ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ

1 生理食塩液　５０ｍＬ	50 ｍＬ	点滴注射	
ポララミン注５ｍｇ	1 Ａ	全開	
			(1) (15)
2 生理食塩液　５０ｍＬ	50 ｍＬ	点滴注射	
プレドニン（水溶性）２０ｍｇ　（　100）ｍｇ		30分	
			(1) (15)
3 生理食塩液　１００ｍＬ	100 ｍＬ	点滴注射	
		30分	
			(1) (15)
4 生理食塩液　１００ｍＬ	100 ｍＬ	点滴注射	
ミンジュビ点滴静注用200mg　（　）ｍｇ (12ｍｇ/kg)		60分	
注射用水　２０ｍｌ	20 ｍＬ	投与速度125mL/hrを超えないこと	
		40mg/mLに溶解し希釈、	
		最終濃度2～8mg/mLに調製	
		83kg以上は生食250mLに希釈	
			(1) (15)
5 生理食塩液　５０ｍＬ	50 ｍＬ	点滴注射	
		フラッシュ用	
			(1) (15)

受付日　　年　　月　　日

6 アセトアミノフェン錠500mg「マ	2 錠		内服 ﾐﾝｼﾞｭﾋﾞ投与60分前 day1,15
7 ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ5mg「BMSH」	(20) mg		内服 day1-21