

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

トアルケタマブ + テクリスタマブ 皮下注 (漸増期)

(登録No. 26HT26)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病名	推奨度
多発性骨髄腫	C

		予定日付	/	/	/	/
Talquetamab	(0.01m g/kg)	↓				
Teclistamab	(0.06m g/kg)	↓				
Talquetamab	(0.06m g/kg)		↓			
Teclistamab	(0.3m g/kg)		↓			
Talquetamab	(0.4m g/kg)			↓		
Teclistamab	(1.5m g/kg)			↓		
Talquetamab	(0.8m g/kg)				↓	
Teclistamab	(3m g/kg)				↓	
Day		1	3	5	7	
		(1サイクル 20 日)		(休薬 13 日以上)		

必要に応じて制吐剤の前投薬を追加可能 CRS注意 TCZ準備要 要時発注：タービー/テクベイリ

1	タービー皮下注3mg	() m g (0.01m g/kg)	皮下注射	(1)
2	テクベイリ皮下注30mg	() m g (0.06m g/kg)	皮下注射	(1)
3	タービー皮下注3mg	() m g (0.06m g/kg)	皮下注射 2～4日の間隔で投与	(3)
4	テクベイリ皮下注30mg	() m g (0.3m g/kg)	皮下注射 2～4日の間隔で投与	(3)
5	タービー皮下注40mg	() m g (0.4m g/kg)	皮下注射 2～4日の間隔で投与	(5)
6	テクベイリ皮下注153mg	() m g (1.5m g/kg)	皮下注射 2～4日の間隔で投与	(5)
7	タービー皮下注40mg	() m g (0.8m g/kg)	皮下注射 2～4日の間隔で投与	(7)
8	テクベイリ皮下注153mg	() m g (3m g/kg)	皮下注射 2～4日の間隔で投与	(7)

9 デカドロロン錠4mg	16 m g	内服
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「	1 錠	day1、3、5、7
アセトアミノフェン錠500mg「マ	2 錠	皮下注投与60分前