

## 化学療法スケジュール表

- 
- 一般治療
- 
- 
- 臨床試験
- 
- 
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**CVD**  
(登録No. 26UR01)

病名	推奨度
褐色細胞腫	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/
CPA (750mg/m <sup>2</sup> )	↓		
VCR (1.4mg/m <sup>2</sup> )	↓		
DTIC (600mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	
	Day	1	2
(1サイクル 21 日) (休薬 19 日以上)			

## 化学療法開始前にα遮断薬を投与すること

1	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分	(1)
2	大塚生食注 (250mL袋) エンドキサン注射用 ( ) mg (750mg/m <sup>2</sup> )	250 mL	点滴注射 60分 MAX 937.5mg/m <sup>2</sup>	(1)
3	生理食塩液 100mL オンコビン注射用 1mg ( ) mg (1.4mg/m <sup>2</sup> )	100 mL	点滴注射 30分 MAX 2mg	(1)
4	生理食塩液 100mL デキサート注射液 6.6mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(2)
5	大塚生食注 (250mL袋) ダカルバジン注用 100 ( ) mg (600mg/m <sup>2</sup> )	250 mL	点滴注射 60分 ルートも遮光 MAX 660mg/m <sup>2</sup>	(1)(2)
6	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)(2)
7	アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1 点滴前服用	

8 アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2,3 朝食後
9 デカドロン錠4mg	8 m g	内服 day3,4 朝食後