

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	印
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

R-CHOP (外来用)
(登録No. 06HT01)

病名	推奨度
非ホジキンリンパ腫	A

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/
Rit-BS (375mg/m ²)	↓						
DXR (50mg/m ²)		↓					
VCR (1.4mg/m ²)		↓					
CPA (750mg/m ²)		↓					
PSL (100mg)		↓	↓	↓	↓	↓	
Day	1	2	3	4	5	6	
	(1サイクル 21 日)		(休薬 15 日以上)				

CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫 6~8コース

1 生理食塩液 50mL ポララミン注5mg	50 mL 1 A	点滴注射 全開	(1)
2 生理食塩液テルモ 500mL リツキシマブBS点滴静注 () mg (375mg/m ²)	500 mL	点滴注射 180分 初回 ~60分 25ml/hr 60~120分 100ml/hr 120分~ 200ml/hr 2コース目からは始め1時間 100ml/hr 以降200ml/hr	(1)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 180分 MAIN	(2)
5 グラネトロン点滴静注ハック 1mg/50mL	1 袋	点滴注射 全開 側管	(2)
6 生理食塩液 100mL ドキシリジン塩酸塩注射液50mg 「サト」 () mg (50mg/m ²)	100 mL	点滴注射 30分 側管	

			Total 100mLに調製	(2)
7	生理食塩液 100 mL オンコビン注射用 1 mg	(100) mL (1.4 mg / ml)	点滴注射 30分 VCR max2mg 側管	(2)
8	生理食塩液テルモ 250 mL エンドキサン注射用	(250) mL (750 mg / ml)	点滴注射 120分 側管	(2)
9	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 側管	(2)
10	アセトアミノフェン錠200mg 「マ	2 錠	内服 リツキマブ 投与30分前	
11	プレドニン錠 5 mg	(100) mg	内服 朝12錠 昼8錠 食後	