

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

Bmab+FOLFIRI (インフューザー使用)
(登録No. 07GI02)

病名	推奨度
大腸癌	A

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／
Bmab (5mg/kg)		↓
1-LV (200mg/m ²)		↓
CPT-11 (150mg/m ²)		↓
5-FU (400mg/m ²)		↓
5-FU (2400mg/m ²)		↓
	Day	1
(1サイクル 14日) (休薬 13日以上)		

1 パロピト点静注ハッガ0.75mg/50 デキサート注射液6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
2 生理食塩液 100 mL ベバシズマブBS点滴静注用 () mg (5mg/kg)	100 mL	点滴注射 90分 初回投与認容性良好なら 2回目投与は60分可 2回目投与認容性良好なら 以降の投与は30分可	(1)
3 生理食塩液テルモ 250 mL レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分 リノカンと同時滴下 側管	(1)
4 ブドウ糖液5% (250 mL) イリノテカン塩酸塩点滴静注液 () mg (150mg/m ²)	250 mL	点滴注射 90分 レボホリナートと同時滴下	(1)
5 フルオロウラシル注 () mg (400mg/m ²) 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 全開 1-LV, CPT-11同時滴下終了後	(1)
6 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
7 フルオロウラシル注 () mg (2400mg/m ²)		中心静脈注射・精密持続	

生理食塩液 50 mL

50 mL

インフューザー使用 46時間
生食希釈量早見表参照

(1)