

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ESHAP
(登録No. 08HT14)

病名	推奨度
非ホジキンリンパ腫	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/
mP S L (500mg)		↓	↓	↓	↓	↓
V P - 1 6 (40mg/m ²)		↓	↓	↓	↓	
C D D P (25mg/m ²)		↓	↓	↓	↓	
A r a C (2000mg/m ²)						↓
	Day	1	2	3	4	5
		(1サイクル 21 日)			(休薬 16 日以上)	

6～8コース

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 茶 ルートキープ 10時～翌10時	(1) (2) (3) (4) (5)
2 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 15分 朝 茶 側管 10時～10時15分	(1)
3 生理食塩液 100mL ソル・メドロール静注用500mg ()	100 mL 500) mg	点滴注射 60分 茶 側管 10時～11時	(1) (2) (3) (4) (5)
4 生理食塩液テルモ 250mL ベプシド注100mg ()	250 mL) mg (40mg/m ²)	点滴注射 60分 茶 側管 11時～12時	(1) (2) (3) (4)
5 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (2) (3) (4)
6 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 白 シスプラチンルートプライミング用	(1)
7 生理食塩液テルモ 500mL シスプラチン点滴静注 ()	500 mL) mg (25mg/m ²)	点滴注射 白ルート 持続滴下 10時～翌10時 CDDPの輸液量はtotal 500mlと	

			なるように生食を抜いて調製	(1) (2) (3) (4)
8	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 白 シスプラチンフラッシュ用	(4)
9	ソルデム3A輸液 500 mL メイロン静注8.4% 20 mL	500 mL 1 A	点滴注射 180分 茶 側管 補液追加あり	(1) (2) (3) (4) (5)
10	ソルデム3A輸液 500 mL	500 mL	点滴注射 白 ルートキープ 10時～翌10時	(5)
11	生理食塩液テルモ 500 mL キロサイド注 () mg (2000mg/㎡)	500 mL	点滴注射 120分 茶 側管 11時～13時 AraCの輸液量はtotal 500mlと なるように生食を抜いて調製	(5)
12	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(5)
13	アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1 点滴開始時	
14	アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2-5 朝食後	