

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

| | | | |
|------|----------------|-----|---|
| 身長 | cm | 診療科 | |
| 体重 | kg | | |
| 体表面積 | m ² | | |
| Scr | mg/dL | 医師 | 印 |
| Ccr | ml/min | | |

CHEP
(登録No. 10HT04)

| | |
|-----------|-----|
| 病名 | 推奨度 |
| 非ホジキンリンパ腫 | C |

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

| | 予定日付 | / | / | / | / | / |
|-------------------------------|------|---|---|---|---|---|
| DXR (50mg/m ²) | ↓ | | | | | |
| VP-16 (100mg/m ²) | ↓ | | | | | |
| CPA (750mg/m ²) | ↓ | | | | | |
| PSL (100mg) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(1サイクル 21日) (休薬 16日以上)

6コース

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| 1 ソルデム3A輸液 500mL | 500 mL | 点滴注射 300分 MAIN | (1) |
| 2 グラネセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1 袋 | 点滴注射 全開 側管 | (1) |
| 3 生理食塩液 100mL ドキシリビシン塩酸塩注射液50mg「サト」 | 100 mL () mg (50mg/m ²) | 点滴注射 30分 側管 Total 100mLに調製 | (1) |
| 4 生理食塩液テルモ 500mL ベプシド注100mg | 500 mL () mg (100mg/m ²) | 点滴注射 90分 側管 | (1) |
| 5 生理食塩液テルモ 500mL エンドキサン注射用 | 500 mL () mg (750mg/m ²) | 点滴注射 180分 側管 | (1) |
| 6 生理食塩液 50mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 側管 | (1) |
| 7 ソルデム3A輸液 500mL | 500 mL | 点滴注射 | (1) |

メイロン静注8.4% 20mL

1 A

180分
補液追加あり

(1)

8 プレドニン錠5mg

(100) mg

内服
day1-5