

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

FOLFIRINOX (インフューザー使用)

(登録No. 14GI02)

病名

膵癌

推奨度

B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／
1-OHP	(85mg/m ²)	↓
1-LV	(200mg/m ²)	↓
CPT-11	(180mg/m ²)	↓
5-FU	(400mg/m ²)	↓
5-FU	(2400mg/m ²)	↓
	Day	1
(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)		

1	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50 デキサート注射液6.6mg デキサート注射液1.65mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分	(1)
2	ブドウ糖液5% (250mL) オキサリプラチン点滴静注液 () mg (85mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分	(1)
3	生理食塩液テルモ 250mL レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分 側管	(1)
4	生理食塩液テルモ 250mL イリノテカン塩酸塩点滴静注液 () mg (180mg/m ²)	250 mL	点滴注射 90分 レボホリナート投与開始30分後に 点滴開始	(1)
5	生理食塩液 50mL フルオロウラシル注 () mg (400mg/m ²)	50 mL	点滴注射 全開 1-LV, CPT-11滴下終了後	(1)
6	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
7	フルオロウラシル注 () mg (2400mg/m ²) 生理食塩液 50mL	50 mL	中心静脈注射・精密持続 インフューザー使用 46時間 生食希釈量早見表参照	(1)

8 アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 点滴開始前 day1
9 アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 朝食後 day2, 3
10 デカドロン錠4mg	8 m g	内服 朝昼食後 day2-4