

## 化学療法スケジュール表

- 
- 一般治療
- 
- 
- 臨床試験
- 
- 
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

## FOLFOXIRI (インフューザー使用)

(登録No. 14GI23)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

病名	推奨度
大腸癌	A

	予定日付	／
CPT-11 (150mg/m <sup>2</sup> )		↓
l-LV (200mg/m <sup>2</sup> )		↓
l-OHP (85mg/m <sup>2</sup> )		↓
5-FU (2400mg/m <sup>2</sup> )		↓
	Day	1
(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)		

1 パロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50 デキサート注射液6.6mg デキサート注射液1.65mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分	(1)
2 生理食塩液テルモ 250 mL イリノテカン塩酸塩点滴静注液 ( ) mg (150mg/m <sup>2</sup> )	250 mL	点滴注射 90分	(1)
3 生理食塩液テルモ 250 mL レボホリナート点滴静注用 ( ) mg (200mg/m <sup>2</sup> )	250 mL	点滴注射 120分 側管	(1)
4 ブドウ糖液5% (250 mL) オキサリプラチン点滴静注液 ( ) mg (85mg/m <sup>2</sup> )	250 mL	点滴注射 120分 レボホリナート同時滴下	(1)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
6 生理食塩液 50 mL フルオロウラシル注 ( ) mg (2400mg/m <sup>2</sup> )	50 mL	中心静脈注射・精密持続 インフューザー使用 46時間 生食希釈量早見表参照	(1)
7 アプレピタントカプセル125mg「N	1 c p	内服 点滴開始前 day1	
8 アプレピタントカプセル80mg「NK	1 c p	内服 朝食後 day2,3	

9 デカドロン錠4mg

8 m g

内服  
朝昼食後 day2-4