

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

VRCAP
(登録No. 15HT01)

病名	推奨度
悪性リンパ腫	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/
Bortezomib (1.3mg/m ²)	↓				↓			↓	↓
Rit-BS (375mg/m ²)	↓								
DXR (50mg/m ²)			↓						
CPA (750mg/m ²)			↓						
PSL (100mg)			↓	↓	↓	↓	↓		
Day	1	2	3	4	5	6	8	11	

(1サイクル 21 日) (休薬 10 日以上)

マンデル細胞リンパ腫 総コース数：6コース

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 ルートキープ 10時～	(1)(2)
2 生理食塩液 50mL ポララミン注5mg	50 mL 1 A	点滴注射 10時～ 全開 ベルケイド投与前	(1)
3 生理食塩液テルモ 250mL	250 mL	点滴注射 ルートキープ	(4)(8)(11)
4 ベルケイド注射用3mg 生理食塩液 20mL	() mg (1.3mg/m ²) 3 mL	静脈内注射 ベルケイド1Vあたり生食3mLで溶解 1mg/mLとして、必要量を計量	(1)(4)(8)(11)
5 生理食塩液テルモ 500mL リツキシマブBS点滴静注	500 mL () mg (375mg/m ²)	点滴注射 10時～ 初回 ~60分 25ml/hr 60~120分 100ml/hr 120分~ 200ml/hr 2コース目からは始め1時間 100ml/hr 以降200ml/hrも可	(1)
6 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)

7	グラセトン点滴静注バッグ1mg/50mL「	1 袋	点滴注射 全開 側管 10時～	(2)
8	生理食塩液 100mL トキソリン塩酸塩注射液50mg「サト(100 mL) mg (50mg/m ³)	点滴注射 30分 側管 10時～10時30分 Total 100mLに調製	(2)
9	生理食塩液テルモ 500mL エンドキサン注射用 (500 mL) mg (750mg/m ³)	点滴注射 180分 側管 10時30分～13時30分	(2)
10	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 側管	(2)
11	ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射 180分 補液追加あり	(1) (2)
12	アセトアミノフェン錠200mg「マ	2 錠	内服 リツキマブ 投与30分前	
13	プレドニン錠5mg (100) mg	内服 朝12錠 昼8錠 day2-6	