

## 化学療法スケジュール表

- 
- 一般治療
- 
- 
- 臨床試験
- 
- 
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

## アフリベルプト+FOLFIRI (入院用)

(登録No. 17GI05)

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

病名	推奨度
大腸癌	B

	予定日付	／	／
アフリベルプト (4mg/kg)	↓		
1-LV (200mg/m <sup>2</sup> )	↓		
CPT-11 (180mg/m <sup>2</sup> )	↓		
5-FU (400mg/m <sup>2</sup> )	↓		
5-FU (1200mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	
Day	1	2	
	(1サイクル 14 日)		(休薬 12 日以上)

1	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分 5FU急速静注後のフラッシュまで パルビん針セット 二股タイプ 使用	(1)
2	生理食塩液 100mL ザルトラップ点滴静注用 ( ) mg (4mg/kg)	100 mL	点滴注射 60分 シュアプ ラグ ADセットのフィルター使用 (ポリエーテルスルホン 0.2μm) 0.6~8mg/mLに調製	(1)
3	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4	生理食塩液テルモ 250mL レボホリナート点滴静注用 ( ) mg (200mg/m <sup>2</sup> )	250 mL	点滴注射 120分 リノカンと同時滴下 側管	(1)
5	ブドウ糖液 5% (250mL) イリノテカン塩酸塩点滴静注液 ( ) mg (180mg/m <sup>2</sup> )	250 mL	点滴注射 90分 レボホリナートと同時滴下	(1)
6	フルオロウラシル注 ( ) mg (400mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 全開 1-LV, CPT-11同時滴下終了後	(1)

7	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
8	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フルオロウラシルトプライミング用	(1)
9	生理食塩液テルモ 500 mL フルオロウラシル注 ( ) mg (1200mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 23時間	(1) (2)
10	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フルオロウラシルフラッシュ用	(2)