

## 化学療法スケジュール表

- 
- 一般治療
- 
- 
- 臨床試験
- 
- 
- 治験

患者氏名  
患者 I D  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**エンドキサン (高用量)**  
(登録No. 18HT07)

病名	推奨度
多発性骨髄腫	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

C P A	(60mg/kg)	予定日付	/	/	/
		Day	1	2	3
(1サイクル 28 日) (休薬 25 日以上)					

1	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 ルートキープ	(1) (2)
2	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6 mg デキサート注射液 1.65 mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分 側管から	(1)
3	生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 mg デキサート注射液 1.65 mg	100 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分 側管から	(2)
4	生理食塩液 100 mL ウロミテキサン注 400 mg ( ) mg (24mg/kg)	100 mL	点滴注射 15分 側管から エンドキサン投与前	(1) (2)
5	生理食塩液テルモ 500 mL エンドキサン注射用 ( ) mg (60mg/kg)	500 mL	点滴注射 180分 側管から C P A : 30~60mg/kg	(1) (2)
6	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (2)
7	生理食塩液 100 mL ウロミテキサン注 400 mg ( ) mg (24mg/kg)	100 mL	点滴注射 15分 側管から エンドキサン投与 4時間後	(1) (2)
8	生理食塩液 100 mL ウロミテキサン注 400 mg ( ) mg (24mg/kg)	100 mL	点滴注射 15分	

18HT07 <次ページ有>

受付日 年 月 日

側管から  
エンドキサン投与 8時間後

(1) (2)

9 生理食塩液 100 mL  
デキサート注射液 6.6 mg

100 mL  
1 瓶

点滴注射  
15分

(3)