

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	印
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**G-CHOP (外来用) 2-8コース目**  
(登録No. 18HT09)

病名	推奨度
非ホジキンリンパ腫	B

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/
Obinutuzumab (1000mg)	↓						
DXR (50mg/m <sup>2</sup> )		↓					
VCR (1.4mg/m <sup>2</sup> )		↓					
CPA (750mg/m <sup>2</sup> )		↓					
PSL (100mg)		↓	↓	↓	↓	↓	
Day	1	2	3	4	5	6	
		(1サイクル 21日)		(休薬 15日以上)			

**CD20陽性濾胞性リンパ腫 6-8コース**

1 生理食塩液 50mL ポララミン注5mg	50 mL 1 A	点滴注射 全開	(1)
2 生理食塩液テルモ 250mL ガザイバ点滴静注1000mg	210 mL ( 1000) mg	点滴注射 Total 250mLに調製 開始~30分 25ml/hr 以降、30分毎に25ml/hrずつ上げる 最大100ml/hrまで 0.2または0.22μmの インラインフィルター使用	(1)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 180分 MAIN	(2)
5 グラネセトロン点滴静注パック 1mg/50mL	1 袋	点滴注射 全開 側管	(2)
6 生理食塩液 100mL ドキシビルン塩酸塩注射液50mg 「サント」	100 mL ( ) mg (50mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 30分 側管	

			Total 100mLに調製	(2)
7	生理食塩液 100 mL オンコビン注射用 1 mg	( 100 ) mL (1.4mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 30分 VCR max2mg 側管	(2)
8	生理食塩液テルモ 250 mL エンドキサン注射用	( 250 ) mL (750mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 120分 側管	(2)
9	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 側管	(2)
10	アセトアミノフェン錠200mg 「マ	2 錠	内服 がザイバ投与30分前	
11	プレドニン錠 5 mg	( 100 ) mg	内服 朝12錠 昼8錠 食後	