

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**G-CHOP (入院用) 1コース目**  
(登録No. 18HT10)

病名	推奨度
非ホジキンリンパ腫	B

施用開始日 年 月 日  
(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/
Obinutuzumab (1000mg)	↓							↓	↓
DXR (50mg/m <sup>2</sup> )			↓						
VCR (1.4mg/m <sup>2</sup> )			↓						
CPA (750mg/m <sup>2</sup> )			↓						
PSL (100mg)			↓	↓	↓	↓	↓		
Day	1	2	3	4	5	6	8	15	

(1サイクル 21日) (休薬 6日以上)

**CD20陽性濾胞性リンパ腫 6-8コース**

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 ルートキープ 10時～	(1)
2 生理食塩液 50mL ポララミン注5mg	50 mL 1 A	点滴注射 10時～ 全開	(1)(8)(15)
3 生理食塩液テルモ 250mL ガザイバ点滴静注1000mg	210 mL ( 1000) mg	点滴注射 Total 250mLに調製 10時～ 初回 ~30分 12ml/hr 以降、30分毎に12ml/hrずつ上げる 最大100ml/hrまで 2回目以降、開始~30分 25ml/hr 以降、30分毎に25ml/hrずつ上げる 最大100ml/hrまで 0.2又は0.22μmの インラインフィルター使用	(1)(8)(15)
4 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)(8)(15)
5 ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射 180分 補液追加あり	(1)(8)(15)

6	ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 ルートキープ 10時～	(2)
7	グラセトン点滴静注バッグ1mg/50mL	1 袋	点滴注射 全開 側管 10時～	(2)
8	生理食塩液 100mL トキソリン塩酸塩注射液50mg「サト」	100 mL ( ) mg (50mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 30分 側管 10時～10時30分 Total 100mLに調製	(2)
9	生理食塩液 100mL オンコビン注射用1mg	100 mL ( ) mg (1.4mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 30分 VCR max2mg 側管 10時30分～11時	(2)
10	生理食塩液テルモ 500mL エンドキサン注射用	500 mL ( ) mg (750mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 180分 側管 11時～14時	(2)
11	生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 側管	(2)
12	ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射 180分 補液追加あり	(2)
13	アセトアミノフェン錠200mg「マ	2 錠	内服 がザイバ投与30分前	
14	プレドニン錠5mg	( 100) mg	内服 朝12錠 昼8錠 day2-6	