

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
S c r	mg/dL		
C c r	ml/min		

RT+mFOLFOX (インフューザー使用)

(登録No. 19GI11)

病名

推奨度

食道癌

C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 コース目・変更)

	予定日付	/
1-LV	(200mg/m ²)	↓
1-OHP	(85mg/m ²)	↓
5-FU	(400mg/m ²)	↓
5-FU	(1600mg/m ²)	↓
	Day	1
	(1サイクル 14 日) (休薬 13 日以上)	

6コース (3コース放射線併用 計50Gy)

1 パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射	
デキサート注射液 6. 6 mg	1 瓶	15分	(1)
2 生理食塩液テルモ 250 mL	250 mL	点滴注射	
レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg/m ²)		120分	
		オキサリプラチンと同時滴下	
		側管	(1)
3 ブドウ糖液5% (250 mL)	250 mL	点滴注射	
オキサリプラチン点滴静注液 () mg (85mg/m ²)		120分	
		レボホリナートと同時滴下	
			(1)
4 フルオロウラシル注 () mg (400mg/m ²)		点滴注射	
生理食塩液 50 mL	50 mL	全開	
		1-LV, L-OHP同時滴下終了後	
			(1)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
		フラッシュ用	(1)
6 フルオロウラシル注 () mg (1600mg/m ²)		中心静脈注射・精密持続	
生理食塩液 50 mL	50 mL	インフューザー使用 46時間	
		生食希釈量早見表参照	
			(1)

19GI11

受付日

年 月 日