

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者 I D  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
S c r	mg/dL	医 師	印
C c r	ml/min		

**Ad-AVD**  
(登録No. 19HT02)

病 名	推奨度
ホジキンリンパ腫	C

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	／	／
DXR (25m g / m <sup>2</sup> )		↓	↓
VLB (6m g / m <sup>2</sup> )		↓	↓
DTIC (375m g / m <sup>2</sup> )		↓	↓
brentuximab vedotin (1.2m g / kg)		↓	↓
	Day	1	15
(1サイクル 28 日) (休薬 13 日以上)			

**6コース CD30陽性ホジキンリンパ腫**

1 ソルデム 3 A 輸液 500 mL	500 mL	点滴注射 180分 MAIN ルートキープ	(1) (15)
2 パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6. 6 m g デキサート注射液 1. 6 5 m g	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分 側管	(1) (15)
3 生理食塩液 100 mL ドキシルビシン塩酸塩注射液50mg 「サント」	100 mL ( ) m g (25m g / m <sup>2</sup> )	点滴注射 30分 側管	(1) (15)
4 生理食塩液 100 mL エクザール注射用 10 m g	100 mL ( ) m g (6m g / m <sup>2</sup> )	点滴注射 30分 側管	(1) (15)
5 生理食塩液 100 mL ダカルバジン注用 100	100 mL ( ) m g (375m g / m <sup>2</sup> )	点滴注射 30分 側管 ルートも遮光	(1) (15)
6 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 側管	(1) (15)
7 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	

アドセトリス点滴静注用50mg 注射用水 20ml	( ) mg (1.2mg/kg) 20 mL	30分 側管 1Vあたり注射用水10.5mLで溶解 5mg/mLの濃度で必要量計算 体重100kg以上は100kgとして計算	(1)(15)
8 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 側管	(1)(15)
9 アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1. 15 点滴開始時	
10 アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2. 3 16. 17 朝食後	