

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者 I D
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ペムブロリズマブ+レンバチニブ
(登録No. 22C005)

病名	推奨度
子宮体癌	C
腎癌	B

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

Pembrolizumab (200mg)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Lenvatinib (20mg)		↓									
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lenvatinib (20mg)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lenvatinib (20mg)	予定日付	/									
		↓									
	Day	21									

(1サイクル 21 日) (休薬 日以上)

子宮体癌：プラチナ製剤を含む化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発症例

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用 全開	(1)
2 生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注	100 mL (200) mg	点滴注射 30分 0.2μm~5μmのインラインフィルターを使用 希釈後の濃度1~10mg/mL となるように調製	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 レンビマカプセル10mg	(20) mg	内服 朝食後 連日	